

9. Impacte sobre la fauna.

L'impacte dels parcs eòlics sobre la població d'aus pren una dimensió mediàtica que no sempre s'ajusta a la realitat. Es tendeix a magnificar l'efecte de les morts per col·lisió amb les pales dels aerogeneradors per justificar l'impacte negatiu dels parcs.

Poc se'n parla, en canvi, de l'efecte que sobre la població de rossegadors i els seus predadors, que viuen en caus soterrats, pot produir la instal·lació d'un parc eòlic.

9.1 Aus

S'ha descrit la presència d'aus rapinyaires com:

- Àliga daurada
- Àliga cuabarrada
- Esparver
- Falcó mostatxut

Les aus autòctones tendeixen a adaptar-se a la presència dels aerogeneradors, mentre que les aus migrants poden modificar lleugerament la seva trajectòria si coincideix amb un parc eòlic. De totes maneres, no es pot descartar que hi hagi impactes d'aus contra les pales.

9.2 Habitants del sòl i del sub-sòl

Presència de petits mamífers:

- Rat penat
- Petits rosegadors
- Conill

I els seus predadors naturals :

- Guineu

En la fase de construcció es poden destruir caus en diverses accions:

- Excavar les rases per a cablejat.
- Excavar fosses per a fonaments de torres.
- Excavar fosses per allotjar centres de connexió.
- Eixamplament de camins.
- Excavació per a plataformes de muntatge
- Obertura de camins nous.

A més, es poden destruir corredors naturals en obrir nous camins i excavar plataformes.

