


EL PORC SENGLAR



PROPORCIÓ DE LA DIETA EN TANT PER CENT

La dieta és omnívora, però en la seva majoria d'origen vegetal. Es dona el cas que l'alimentació en exemplars petits (d'edat) té més component animal, segons els recursos disponibles en el moment. En la seva recerca d'aliment, provoquen forçades que no beneficia el creixement d'espècies que es reproduïen a partir del bulb. En el moment d'estudi i projecte, ens centrem en la època octubre-desembre on clarament s'alimenten de aglans de roure (quercus ilex) que es troben a les vores de camins i carreteres. En conseqüència provoquen accidents en llocs on la visibilitat es reduïda. Segons el sexe pot variar (femelles-vegetals, i mascles-aglans).

UN DIA SENCER (24 HORES)

El senglar és un dels mamífers més grans de Catalunya, és objecte d'una gran activitat cinètica i planteja grans reptes de gestió, com a conseqüència de la seva expansió demogràfica. De tota la família, el seu gènere 'sus', en concret el 'sus scrofa' és el senglar eurasiàtic, present al nostre entorn. En podem trobar 17 subespècies. Tots ells han estat objecte de processos de domesticació. Algunes mostrant caràcter intermitents entre porc i senglar salvatge. La gran diferenciació és la màxima alçada darrera de les potes i un coll poc marcat. L'olfacte és el sentit que tenen més desenvolupat per fer totes les funcions.

ETAPES DE GESTACIÓ

Els senglars no mostren gaire dimorfisme sexual, i no podem diferenciar el mascle de la femella en etapa adulta d'una forma relativament fàcil: pels ullals, el gruix de la pell, la crinera i el seu color o espessor de cabell i el pinzell de pels que assenyalen l'emplaçament del penis. Les dimensions i els pesos poc variables. L'estructura social de les poblacions es força dinàmica i canviant al llarg de l'any. La unitat bàsica són les femelles que recorren amb les seves cries les zones. Durant el període de zel, els mascles adults, que van sols (amb escuders, en casos d'avançada edat) expulsen als mascles (fills) del grup per passar a la còpula. Evidentment hi ha competició i pugna per les femelles.

NOMBRE DE MEMBRES SEGONS MES DE L'ANY I GRUP

El número d'exemplars per grup varia en funció de l'època de l'any. A banda dels factors biològics, hi ha una dependència de les estructures socials que es manifesta en la grandària dels grups. La mitjana és de 3-5 exemplars amb un augment en l'època de tardor. L'activitat del grup és preferentment nocturna, i s'espècula que sigui com a conseqüència de la presència dels humans (caça i captura). La major part del temps es dedica al moviment i a l'alimentació. Tenen unes zones de centralitat i uns sectors perifèrics esporàdics en funció dels recursos disponibles. L'espai que ocupen és inversament proporcional a l'aliment.