

Melospiza gallopavo. - Inestab. subditge per la sola abstracció s'ha trobat a Amèrica, Verde s'ha entès per tot temps: Assin, en les regions més o menys calentes.

L'indiat domèstic procedeix de l'indiat marci, i no difereix gaire de l'indiat subditge. Solament a augmentat en talla, en amplitud, i temperament més tranquil, i ha perdut l'agilitat.

L'indiat hinda en una copa ampla i llarg, una, i mes de sol d'les en el ventre, i mes gros, i més llarg considerablement quant s'excita; amb nervures carrosses, acubant amb un penjell de cera. El cor negre fosc que arriba fins al celar ventral. Cell no gaire llarg i arquejat. Zona ventral, ampla, i aproximada a la part posterior. Dors en forma de volta. El ventre recorda la forma de un arc. Les os curules en el pit de la ha un flac de pits llargs. Una antena i una altra curula, en els muscels fa la vida quant s'excita i s'infesta. Curules fortes, plomatge curvit, pits altes, vores, i amb espines. El color dels barbis ni de brucelat es negre gris, en els blancs remoltons, en els angles fosc.

Res curules brucelats 15-20 pils, femelles 8-12 q.

Dues vores: L'indiat negre que a França el venen amb el nom de Subegne, i el brucelat.

L'indiat negre ^{originari de la vorera del Mississipi} de plomatge negre habitant en el nord, i més espantat en la família. L'avis llarg: negres, envorjant-se en els exemplars vells. P. i. espalla ampla. Conarments blaus: no es descomblen. Curules fortes. En aquest l'indiat negre es esbelt, longuissim, i molt més aproximada a la vida remota. De parures. Morda de mang 8-10 q. femelles 5-7 q.

Allogliamento. Els individus men de respiració molt activa, i de mica sense respirar.
Comportament a rulls de fent per cada animal. Els j. q. pens de 10x0'05 i exportats de 75 ans.
Els reproductors frescos sense vidus, tals de cutò. Els j. q. pens a fent de terra. Els de ciment.

Nials de 40x60x60, fosc. Els j. q. de ferir de curar ben curats, sense curats d'aire ni que hi hagin fins a les 6-8 setmanes que passen la crisi de la mena d'una Passada aquesta crisi de individus estans curats.

La cura d'individus necessita molt espai.

Reproductors. - Per a accelerar la parta sovintem un fins de començament de febrer pel gener. Les femelles pariran 2 anys. La femella comença la parta als 10 mesos, i el primer any la femella servir per a covar i el altre anys fins el 4.5 = per a la parta d'uns per a curar. La parta i de 20 a 50 ans. per a 200 penides. a la primavera de 12 a 18, i a la tardor un altre parta una mica mes tardia.

Una anada per 10 femelles, i els ans poden guardar-se uns 20 dies.

Quelcoms: forpeta - Si una parta d'ind. a la sangrera en un moment o fese la animal al cap de 2.3 dies ^{de vegades} de la filna d'imbució.
Naturalment d'una manera natural comencen a covar pel març o abril.

15 a 20 ans. ^{ans?} o 25 de fillines i 12 de ca. El nombre d'animals als 5-6 dies. El desenvolupament comença al 28-29 dia. De manera que així els setmanes amb curada, a fi que l'individu no els despitzi. Una individu pot menar 25/30 individus.

Cuina (1.) Podem usar-los en una mare anti-fèrtil, o donar-los a la lleure.

Primer dia ^{durant} 6 hores en digiú. Després de passar 8 dies, una alimentació rica en proteïnes animals fresques: i peix amb llet, i llet condensada, di fèrtil heralta, i f. de cuina.

Des de 8^a dia al menjar hi hi venen poca sang, i el vespre blut hument.

1^a apart. lleus de conreu

2^a carnis una, o carnis

3^a {ordi
ceba
partit amb llet

4^a blut

5^a fang d'

i cada dia pe sucant amb ari.

Polvos de canyella	30
genisana	10
gingelva	100
anis	10
carbónet de ferra	50
carbó d'alsium	10

Des de la curació del anue : una ullerada de cefè per cada 10 animals

Passada la curació del anue la curació pot ser:

(pulpa)	Remoltes, mates	4 g.
	Pisins	4
	carbónet	0'5
	carne	0'2
	llet	1'3

} R. N = 1:3

Vindura abundant i molta llet per dia.
3apats al dia.

RECEPCION
 L'ROSTRA: TIBELON 24/11/19
 ZEMER
 MICE D'VENICA
 MIVACOWI LILVI DE CVETIMAV

Cria. (1) - Els miansen en un local ben ventilat, sense corrents d'aire, i ben calent, recordem que els indietos son uns animals que procedeixen dels passos d'alta. A les indietes que s'inguen de criador-se dels petits, les preniament les desinfectarem els pells, puix aquests als indietos petits els atropellen molt.

Els indietos els alimentarem amb aliments escollits: segones bones, blat, ordi, llet de cabra i faves, verdura finament triturada, i una bona proporció de far. D'altres: de fofats d'ossos, i far. de canya. L'indietes una de deixar-los sortir a les hores calentes del sol, però evitant ~~qualsevol~~ evitar de refredaments. Els indietos per a criar-los om: fants, s'han de criar amb molta llibertat, però vigilants que no es mullin, ni deixar-los sortir quant encara hi ha mullera, ni faltar-los massa fants.

Crisis delraig o del mac. - A la primera aturada dels indietos ja son molt actius i molt merjaires, però cap allà de 2 mesos, passen la crisis delraig, o sigui la crisis de les convulsions, és una fase crítica de la vida. Quan l'indiet ha passat aquesta crisis ja està calent, aleshores es fan molt més vendes. La crisis delraig moltes vegades produeix un 40% de mortaldat, malgrat tot la cura que es faigui.

BYBCEGOM

Queret' 191: Tarron 23-4-11

SECRET' 191: TARRON 23-4-11

REPUBLICA DE CATALUNYA



Engreïment - Solament engrèssarem els animals ben desenvolupats. Els porcs en

parquets ben nets: Donarem Onda i civeta.

Ondes 5
Muresc 2
civeta 0'5
Llet 1'5

R. N 1:4

Se volen que pesin 8 a 10 quilos ben engrèssats
mecanicament. Onda } llet gran total suficient
Muresc }

L'engreïment dura 6 setmanes, si es fa mecànicament 3 setmanes.

Quan la cria del porc la cria ja pot donar-se per analoga, els individus ensiem a pasturar i com a complement els hi donarem pastures de pastures, ondi, segones, etc al final, abans de vendre'ls els alimentarem intensament, a fi d'engreïtar-los, a base de por. d'ondi, llet de mure, i llet desnatada, donat en 4 o 5 apats al dia, o millor per l'engreïment mecànic durant 6 setmanes.

МУКСЕГОЛУ
ДРЕВТ' 191: ДРЕВОК ДО Ч
ЗКАРИЗ ДЕСИМС Д'УВНОСА
МУКСОМДИИЛ DE CVLIV

