

Llibre 37

Cura dels conillots. -

Cura que deu tenir-se amb els petits. - Els conills neixen nusos i amb els ulls closos. La confecció del nin va a càrrec de la mare, però el curador vigilava sempre que els nins estiguin aïents i ben fets.

Dins dels 48 hores de nascuts inspeccionarem defintivament el nin, i farem les mutacions necessàries per a igualar les conillades.

Al cinquè dia de nascuts els petits començaran a cobrir-se de barriçol, i al novè dia ja estaran coberts de pel completament. Al oser dia començen a obrir els ulls, i a sortir del nin al cobrarse o quinzè dia.

Evitarem distribuir aliment a la mare mentre estigui alletant als petits, que acostuma a fer-ho al matí i al capvespre. Durant els primers quinze dies es vigilava sempre atentament el nin, rebornant els petits al que fugin del nin al seu lloc. En el dia quinze farem una neteja general del nin canviant tot el nin. Desde que els conills surten del nin començen a menjar, i tendrà d'augmentar-se la racció de la conilla, a fi que aquesta no es trovi perjudicada en la seva producció lactea.

Detallament - al nostre país els conills es colliren al mes, la practica mes recomanable es donar el nin aïent la conilla al març a les tres setmanes, i si queda coberta, d'una manera natural, al cap de quinze dies quedara aïenta, i tendrem de breure furament els petits. Quan volem garantir als petits una a futures reproduccions, a la llorigada solament hi deixarem la conilla, i no els desmuntarem fins als 45 dies.

Principalment evitarem de l'alimentació dels petits, a fi que no contraiguin diarrea

Pot usar-se dos procediments: 1: Per lligadura
2: Per incisio.

Castrois per lligadura: Es necessita dues persones; el conill es posa sobre els genolls de l'ajudant que l'ajudarà per l'espatlla i amb el cap girat cap a ell, l'operador amb un cordell s'empalmarà a punt. Descolirà els organs genitals per una lligadura presa al baix ventre, fent baixar els testicles a les bosses; amb el cordell farem una lliga, per vent farem passar el testicul, i estremyem fortament, fins que el conill faci un petit mit, un petit sobresalt. S'assegura la lligadura per un anyo més; es talla el cordell. Es repeteix per l'altre testicul.

Castrois per incisio: Per aquest procediment quant s'ingressa el conill subjugat, farem una incisio a la bassa sense tocar el testicul, per pressio farem sortir el testicul per l'incisio, amb una fil lligarem el cordo testicular, i tallarem per sobre la lligadura. El conill capat el posem sobre un jas de palla dolça i ben seca. Descarem l'animal a mitja hora. Els animals estaran en dejà de 24 hores.

Establiment Alimentari. -

Establiment de racions: El conilltor establirà les racions segons les següents

normes:

[Faint, illegible text]

Racionament. - La quantitat d'aliments que formen la rasió varia amb l'espècie, raça, edat, sex i individualitat. La quantitat d'aliments que consumeixi diàriament cada individu ha de repartir-se en dos apartats, i de forma que cada vegada s'ho acabi tant, que al apart següent no quedi ja res del apart anterior.

Alimentació - Molt s'ha dit i escrit sobre la conveniència de donar o no aigua al conill. De totes les maneres poden viure-se bé els conills, puix si en els procediments fos molt difícil prendre quantitat de veritat.

El donar aigua als conills en cap cas és una mala costuma. El conill que s'alimenta d'herbes tendres no sent cap necessitat de beure, però quant faltin aquestes, alhora hem de proporcionar aigua, en quin cas és preferible que hi estiguin acostumats de sempre, sobretot els conills en gestació, puix al donar-los-hi l'aigua i no estar-hi acostumats pot venir a engegar i fer-li mal.

Distribució dels apartats - Els enemics de la uniculturalitat afirmen que un conill menja tant com una vaca. D'aquesta i de moltes altres coses cal desfer-se, si un fons de veritat, ja que si no donem els aliments d'una manera adequada, el conill en l'herba, hestitja i en fa malbé més que no en menja.

els faratges els donarem en un vasell, i els aliments concentrats en una menjadora adequada. ~~La fessant~~ El vasell prova que'l conill hestitja i molts de picum els conills.

El conill farà dos apartats al dia, un al matí, i un al vespre, el més important al vespre. Els conills plens i les que alleben, especialment aquestes últimes poden rebre més

afets al dia. La Distribució d'afets és farà sempre a la mateixa hora.
Evitarem sempre donar herbes fermentades als conills, puix provoquen el meteorisme o "ques ventre"
i quodament que les herbes mullades. Les herbes mullades abans de aixugarem estes en capes
ben primes, i anecada a l'ombra.

En cas de no poder disposar d'herbes seques per mal temps per exemple, les donarem
horejades amb farratges secs, i procurant que primer mengin els farratges secs.
Especialment no donarem mai als conills herbes seques o verdes de gelbra, en les
femelles plenes inclis poden ocasionar avortaments.

Alimentació dels mascles - Els mascles en repós viuran una R.N. ampla, però
sense que s'engressin. Avant treballi una R.N. estreta, i com a excitant donem civada.

Alimentació de les femelles prenyes i de les que alleten - Les femelles prenyes o alleten
viuran una alimentació bona en qualitat i en forta quantitat.
Des des abans del part donarem aliment galactogen com el fondl. o tants de
cacaolunt, en petites quantitats, puix que son aliment calent. A les femelles en qualsevol
del seu estat no es mai aconsellable donar-los hi sego, puix aquest produiria moltes
vegades convulsions que podrien ser gasterals, o mabeu els petits.

Disfenteries rars en per a femelles que alleten i les plenes, per quilo de pes:

- a) 100 grs. d'alfals abans de florir
- 20 grs. de fene
- 20 grs. d'ordi

- b) 100 grs. d'alfals
- 25 grs. de fene
- 15 grs. d'ordi
- 20 grs. de cecolatxa.

